

## 【乾癬 生物学的製剤一覧】

商品名										
一般名	インフリキシマブ	アダリムマブ	セルトリズマブ	セクキヌマブ	イクセギズマブ	プロダルマブ	リサンキズマブ	ウステキヌマブ	グセルクマブ	チルドラキズマブ
作用機序	TNF $\alpha$ 阻害	TNF $\alpha$ 阻害	ペグ化TNF $\alpha$ 阻害	IL-17A阻害	IL-17A阻害	IL-17受容体A阻害	IL-23阻害	IL-12とIL-23阻害	IL-23p19阻害	IL-23p19阻害
投与方法	点滴	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射
1回の投与量	初回 体重1kgあたり5mg 2週、6週後も同量  以降 8週間隔で投与 ※6週以後増量及 び投与間隔の短縮 可能	初回80mg (2本)  以降 2週間隔で 40mgまたは80mg (1本または2本)	初回400mg (2本)  2週、4週後400mg (各2本)  ①200mg(1本) ②400mg(2本)	初回300mg (2本)  5週まで 週1回300mg (2本)  以降 4週間隔で300mg (2本)	初回160mg (2本)  12週まで 2週間隔で80mg (1本)  以降 4週間隔で80mg (1本)	初回210mg (1本)  2週まで 週1回210mg (1本)  以降 2週間隔で210mg (1本)	初回150mg (2本)  4週後150mg (2本)  以降 12週間隔で150mg (2本)	初回45mg (1本)  4週後45mg (1本)  以降 12週間隔で45mg (1本)	初回100mg (1本)  4週後100mg (1本)  以降 8週間隔で100mg (1本)	初回100mg (1本)  4週後100mg (1本)  以降 12週間隔で100mg (1本)
投与間隔	8週間	2週間	①2週間 ②4週間	4週間	4週間	2週間	12週間	12週間	8週間	12週間
自宅での自己注射 (×の場合は 病院にて皮下注射)	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×
自己注射可能な場合 受診1回当たりの 投与量(3ヶ月分)	—	3~6本	6本	6本	3本	6本	—	—	—	—
効果不十分な際 増量できる	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×